



## Alopurinol (Zyloprim®)

*En el Centro Clínico es referido como Alopurinol (en inglés, Allopurinol, con pronunciación: al-oh-PURE-I-nol).*

---

<b>Cómo Se Administra</b>	Oralmente (por la boca) o intravenosamente (por una vena)
<b>Mecanismo de Acción del Fármaco</b>	La destrucción de las células del cáncer causa que el ácido úrico se acumule en la sangre y orina. El Alopurinol detiene la acumulación del ácido úrico.
<b>Efectos Secundarios</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pueden ocurrir erupciones en la piel y comezón. Éstos desaparecerán cuando la dosis se disminuya o se suspenda el medicamento.</li><li>2. Puede ocurrir náusea, vómito o diarrea.</li><li>3. Puede ocurrir somnolencia.</li></ol>
<b>Instrucciones Especiales</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tómese el alopurinol durante las comidas o después de éstas para disminuir el malestar estomacal.</li><li>2. Tome de 10 a 12 vasos de líquidos cada día para mantener sus riñones funcionando bien.</li><li>3. No consuma alcohol o bebidas que contengan alcohol mientras esté tomando el Alopurinol. El alcohol puede aumentar la cantidad de ácido úrico en la sangre y disminuir el efecto del Alopurinol.</li><li>4. No tome ningún medicamento con receta médica o medicamento de mostrador (“over-the-counter,” en inglés) sin antes hablar con su médico del NIH. Éstos incluyen las vitaminas, los tratamientos herbales, gotas para la nariz, medicamentos para el resfriado, influenza (gripe), dolor de cabeza, dolor, fiebre del heno y alergias.</li></ol>

5. No conduzca un auto, opere maquinaria o realice actividades que requieran el estar alerta mentalmente hasta que conozca su reacción a este medicamento.
6. Llame a su médico o enfermera del NIH si usted:
  - no puede tomarse el alopurinol
  - tiene una erupción en la piel, comezón o urticaria
  - no puede tomar líquidos por más de 1 día o no puede comer por más de 2 días
  - tiene diarrea durante más de 2 días
  - tiene somnolencia durante el día lo cual hace que sea difícil realizar sus actividades normales



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Serie Viviendo con Quimioterapia para el Cáncer  
Enero de 1983; Borrador, Octubre de 1999;  
Aprobado, Febrero del 2001  
Institutos Nacionales de Salud,  
Departamento de Enfermería del CC